

PAR Provtagningsinstruktion: träckprov häst

Träckprov bör tas färskt och helst skickas till SVA samma dag. Om luften pressas ut ordentligt ur påsen kan träckprov förvaras i kylskåp (inte i frys) över ett veckoslut innan det skickas. Det är viktigt att skicka minst 70-80 gram från varje häst, se bilder:



INDIVIDUELLT PROV

Ta en rejäl näve färsk avföring, minst 70-80 gram (se ovan) från boxen och förpacka i dubbla plastpåsar som märks på utsidan med hästens namn. Skriv gärna tydligt och på etikett eller tejp så minskar risken för att det blir fel. Pressa ur luften ur den innersta påsen innan den försluts ordentligt. Ifall avföringen är lös bör du lägga något absorberande mellan påsarna. Vi rekommenderar att flera/alla hästar provtas även om de varit i samma hage, då äggnivåerna kan variera kraftigt mellan olika individer. Använd remissen Träckprov-häst när prov från enstaka hästar skickas in. Du kan även beställa analyser via MASK-appen som kan hämtas på www.sva.se.

SAMLINGSANALYS

Samplingsanalyser rekommenderas inte i normalfallet. Det kan vara aktuellt om det inte är möjligt att låta analysera proven individuellt. Observera dock att för t. ex. stor blodmask och bandmask minskar chansen att hitta en infekterad individ om prov från flera hästar blandas jämfört med om individuella analyser utförs.

Skicka individuella prover (tas enligt ovan) till laboratoriet med uppgift på remissen om vilka hästar som skall analyseras tillsammans (pools). Tänk pool kan markeras med klammer intill hästarnas namn. Max tre individer bör analyseras tillsammans. På laboratoriet vägs lika mycket träck upp från vart och ett av de tre proven som ska ingå i en pool. Använd remiss Träckprov-häst till prov från hästar som ska samanalyseras (pools).

ÖVERVAKNING AV PARASITER PÅ HÄSTGÅRDAR

Det finns möjlighet för stall/gårdar att delta i SVA:s övervakningsprogram för gårdar. På våren skickas prov från minst 8 hästar. Programmet inkluderar individuell provtagning (se ovan) en till tre gånger per år samt gårdsanpassad rådgivning om parasitkontroll och avmaskning. Proverna skickas in tillsammans med en särskild remiss: Övervakning parasiter i hästbesättningar (den hittar du bland våra remisser). Märk helst påsarna med både hästnamn och nummer från remissen. När prov skickas in första gången för analys enligt övervakningsprogrammet, är det bra om tillhörande frågeformulär bifogas (se länk under Skicka in prov). Även för övervakningsgårdar är det viktigt att skicka tillräcklig provmängd – minst 70-80 gram. Det går bra för gårdar att beställa prov via MASK-appen.

TEJPPROV FÖR SPRINGMASK

För undersökning avseende springmask (*Oxyuris equi*) kan tejpprov bifogas med träckprov.

Tvätta mekaniskt runt anus kvällen innan du ska ta prov. Prov tas genom att du trycker bitar av genomskinlig tejp mot huden runt anus, där springmaskhonorna brukar vispa ut sina ägg (gulaktig substans). Sedan kan till exempel ett lock till en burk användas för att fästa tejprensorna, se bild. På medföljande remiss ska framgå att undersökning för springmask önskas. Tejpproven skickas tillsammans med remiss och träckprov till SVA för analys.

