

MIK/BKT, Provtagningsinstruktion för ringormsprov, katt

Material som behövs:

- Ny, ren tandborste
- Aluminiumfolie
- Två kuvert
- En remiss:
 - [Remiss för privatperson](#)
 - [Remiss för veterinär](#)

Utförande:

- Borsta igenom katten med tandborsten.
- Har katten förändringar kan du rycka loss hår från kanten av förändringen.
- Kontrollera att det verkligen finns päls i borsten och ta mycket material!
- Lägg tandborsten och allt hår på folien. Vik ihop, märk folien med kattens namn och stoppa det i det ena kuvertet.
- Fyll i remissen med namn, adress, telefon, eventuell e-postadress, kattens namn och att ringormsundersökning önskas. Nämn om katten är behandlad eller om det finns ringormsfall i omgivningen. Glöm inte att skriva under med ditt namn.

Samlingsprov:

Om det finns flera katter i samma hushåll går det bra att ta samlingsprover. Vid samlingsprover är det gruppen och inte individen som bedöms.

Det går att analysera 3 – 4 katter med samma undersökning. Vid fler än fyra katter i hushållet behövs flera samlingsprover (sex katter blir till exempel två samlingsprover med tre tandborstar i varje prov).

- Ta en ny ren tandborste till varje katt (om någon katt är smittad är det viktigt att smittan inte sprids mellan katterna vid provtagningen).
- Lägg alla tandborstar som tillhör samma samlingsprov i samma paket. Skriv att det är ett samlingsprov på remissen.

Insändande av prov:

Lägg prov och remiss i det andra kuvertet och posta till SVA:

SVA

Avdelningen för mikrobiologi

751 89 Uppsala

Analysen tar upp till två veckor. Ringormssvampar tar lång tid på sig att växa ut. Ett preliminärsvår skickas ut efter två till fem dagar. Är provet positivt hör vi av oss så fort vi vet något.