

Lathund för vaccination via dricksvatten

- Kontrollera flockens vattenförbrukning (under 24 timmar).
- Använd inte syra eller desinfektionsmedel i vattnet två dagar före vaccinationen.
- Vattenledningssystemet spolas rent dagen före vaccinationen.
- Doserutrustning ska vara renspolad. Filter mellan doserutrustning och djurutrymmet tas bort.
- Stäng av vattnet och törsta djuren i 1–2 timmar före vaccinationen.
- Blanda vaccinet i väl rengjorda (bara med vatten) behållare som bara används för vaccinblandning.
- Vaccinblandningen anpassas efter flockens vattenförbrukning under 2 timmar och den procentandel som doserutrustningen är inställd på.
- Till en förblandning/stamlösning med _____ doser behövs _____ liter vatten och _____ liter skummjolk.
(Räkna ut hur mycket vaccin du använder i varje hus så går det lättare att blanda rätt)
- Öppna vaccinflaskorna under vatten-/mjölkytan och blanda väl.
- Starta vaccinationen.
- Gå ner till slutändan av alla nippelrör och släpp ut vatten tills vaccinlösningen kommer fram, använd en ficklampa så det går att se när färg/mjölklösningen kommer.
- Stäng då vattenledningen i ändarna på rören.
- Kontrollera att vaccinet går åt på ca 1,5 - 2 timmar.